

Original Article

Effectiveness of Health Promoting Lifestyle Training in Health Hardiness, Self-compassion, and Behavioral Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetes

Azadeh Edalat¹
Zahra DashtBozorgi^{2*}
Marzieh Talebzadeh Shoshtari²

1. PhD Student, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2. Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

*Corresponding author: Zahra DashtBozorgi, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Email: zahradb2000@yahoo.com

Received: 14 December 2022

Accepted: 12 March 2023

ABSTRACT

Introduction and purpose: Patients with diabetes face many problems, especially in the field of health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation. As a result, the present research aimed to investigate the effectiveness of health-promoting lifestyle training in health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation in patients with type 2 diabetes.

Methods: This study was conducted based on a semi-experimental pretest and posttest design with a control group. The statistical research population was patients with type 2 diabetes who were members of Ahvaz Diabetes Association in the winter of 2021. After reviewing the inclusion criteria, 50 people were selected as a sample with the available sampling method and randomly assigned to two equal groups ($n=25$ in each group). The experimental group underwent eight 90 minutes sessions of Aljani et al. health-promoting lifestyle training (2015), and the control group remained on the waiting list for training. Data were collected with the demographic information form, revised health hardiness inventory (Gebhardt et al., 2001), self-compassion scale (Neff, 2016), and behavioral emotion regulation questionnaire (Kraaij and Garnefski, 2019) and analyzed in SPSS software (version 19) using chi-square, independent t-test, and multivariate analysis of covariance.

Results: The results demonstrated that the experimental and control groups did not significantly differ in terms of gender, education level, and age ($P>0.05$). The other findings pointed out that health-promoting lifestyle training led to increased health hardiness ($F=575.597$, $P<0.001$), self-compassion ($F=283.882$, $P<0.001$) and behavioral emotion regulation ($F=633.967$, $P<0.001$) in patients with type 2 diabetes ($P<0.001$).

Conclusion: As evidenced by the results of the present study, health professionals and therapists can use the health-promoting lifestyle training method along with other training methods to improve the psychological characteristics of patients with type 2 diabetes, especially increasing health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation.

Keywords: Diabetes type 2, Emotion regulation, Healthy lifestyle, Health, Self-compassion

► **Citation:** Edalat A, DashtBozorgi Z, Talebzadeh Shoshtari M. Effectiveness of Health Promoting Lifestyle Training in Health Hardiness, Self-Compassion, and Behavioral Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetes. Journal of Health Research in Community. Spring 2023;9(1): 75-87.

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرخختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو

چکیده

مقدمه و هدف: مبتلایان به دیابت با مشکلات فراوانی بهویژه در زمینه سرخختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان مواجه هستند. درنتیجه، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرخختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو بود.

روش کار: این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مبتلایان به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت شهر اهواز در زمستان ۱۴۰۰ بودند. ۵۰ نفر پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه ۲۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت علیجانی و همکاران (۱۳۹۴) قرار گرفت. گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش باقی ماند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی، سیاهه تجدیدنظر شده سرخختی سلامت (گیهارت و همکاران، ۲۰۰۱)، مقیاس شفقت به خود (نف، ۲۰۱۶) و پرسش نامه تنظیم رفتاری هیجان (کراجی و گارنسکی، ۲۰۱۹) جمع آوری و با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها نشان داد گروه های آزمایش و گواه از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سن تفاوت معناداری نداشتند ($P > 0.05$). یافته های دیگر نشان داد آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت باعث افزایش سرخختی سلامت ($F = 575/597, P > 0.001$)، شفقت به خود ($F = 283/882, P > 0.001$) و تنظیم رفتاری هیجان ($F = 633/967, P > 0.001$) در مبتلایان به دیابت نوع دو شد.

نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، درمانگران و متخصصان سلامت می توانند از روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت در کنار سایر روش های آموزشی برای بهبود ویژگی های روان شناختی مبتلایان به دیابت نوع دو، بهویژه افزایش سرخختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان استفاده کنند.

کلمات کلیدی: تنظیم هیجان، دیابت نوع دو، سبک زندگی سلامت، سلامت، شفقت به خود

◀ استناد: عدالت، آزاده؛ دشت بزرگی، زهرا؛ طالب زاده شوستری، مرضیه. اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرخختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، بهار ۱۴۰۲، دوره ۹، شماره ۱ (۹۹): ۷۵-۸۷.

آزاده عدالت^۱

زهرا دشت بزرگی^۲

مرضیه طالب زاده شوستری^۳

۱. دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

۲. استادیار، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

* نویسنده مسئول: زهرا دشت بزرگی؛ گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

Email: zahradb2000@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مقدمه

دیابت نوع دو یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز است که تولید یا عملکرد انسولین یا هر دو در این بیماری دچار

با بیماری‌ها و شرایط چالش‌انگیز مرتبط با سلامتی از راهبردهای مقابله‌ای سازگار استفاده می‌کنند، سلامت و بیماری را قابل کنترل می‌دانند، خود را ملزم به رعایت، حفظ و ارتقای سلامتی می‌کنند و بیماری‌ها و چالش‌های مرتبط با سلامتی را فرصتی برای رشد می‌دانند [۱۰].

یکی دیگر از مشکلات روان‌شناختی مبتلایان به دیابت، افت شفقت به خود است [۱۱]. شفقت به عنوان آگاهی از رنج به عنوان عنصر شناختی، نگرانی و دلوایسی همدلانه نسبت به رنج کشیدن به عنوان عنصر عاطفی، مسئولیت‌پذیری یا آمادگی برای کمک به رهایی از رنج به عنوان عنصر انگیزشی و آرزو و امید برای رهایی از رنج به عنوان عنصر هدفمندی است [۱۲]. شفقت به خود به عنوان دلسوزی نسبت به خود هنگام مواجهه با شکست‌ها، نقص‌ها و عدم کفايت‌هast که نوعی جهت‌گیری کلی مثبت نسبت به خود است، زمانی که همه‌چیز بد پیش می‌رود [۱۳]. شفقت به خود شامل سه مؤلفه دوقطبی شامل مهربانی با خود (گرمی و لطفت با خود) در مقابل قضاوت خود، اشتراکات انسانی (پذیرش مشکلات زندگی به عنوان بخشی از تجربه‌های مشترک انسان‌ها) در مقابل انزوا و ذهن‌آگاهی (آگاهی از افکار، باورها و احساس‌های خود) در مقابل همانندسازی افراطی است [۱۴]. شفقت به خود موجب احساس مراقبت فرد از خود، افزایش آگاهی و شناخت، نگرش مثبت بدون داوری نسبت به عدم کفايت‌ها و شکست‌ها و پذیرش تجربه‌های خود به عنوان واقعیت‌های قابل تجربه برای هر فرد است [۱۵].

یکی دیگر از مشکلات روان‌شناختی مبتلایان به دیابت، نقص در تنظیم رفتاری هیجان است [۱۶]. تنظیم هیجان فرایندی است که افراد از طریق آن هیجان‌های خود را کنترل می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه و چه وقت آن‌ها را ابزار کنند یا تغییر دهند [۱۷]. به طور کلی، دو شیوه تنظیم هیجان شامل تنظیم شناختی و رفتاری هیجان وجود دارد که تنظیم رفتاری هیجان کمتر مورد توجه قرار گرفته است [۱۸]. تنظیم رفتاری هیجان نوعی از تنظیم

اشکال می‌شود و شیوع آن در جوامع مختلف به حد اپیدمی رسیده است [۱]. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از مبتلایان به دیابت نوع دو مبتلا هستند که بیش از ۹۵ درصد فرایند مراقبت و درمان توسط خود بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با عنوان خودمراقبتی انجام می‌شود و تیم درمان کنترل کمی بر بیماری دارد [۲]. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی دیابت، در سال ۲۰۱۹ در جهان ۴۶۳ میلیون نفر به دیابت مبتلا بودند و پیش‌بینی می‌شود این آمار در سال ۲۰۴۵، بیشتر از ۷۰۰ میلیون نفر شود [۳]. در ایران، فراوانی این بیماری $\frac{3}{5}$ میلیون نفر گزارش شده است و برآورد می‌شود تا سال ۲۰۵۰، این رقم به $\frac{1}{5}$ میلیون نفر برسد. در بیماران دیابتی، عوارض کلیوی ۱۷ برابر، بیماری قلبی و سکته مغزی ۲ برابر، گانگرون اندام‌ها ۵ برابر و خطر کوری ۲۵ برابر بیشتر از افراد عادی است [۴]. دیابت نوع دو به عنوان یک بیماری متابولیک مزمن برنامه مراقبتی خاص خود را دارد که شامل ورزش، تغذیه، کنترل قند خون، وارسی پاها و پاییندی به دستورالعمل‌های پزشکی است [۵].

یکی از پیامدهای روان‌شناختی دیابت، کاهش سرسختی سلامت است [۶]. سرسختی به عنوان یک منبع مقابله در مواجهه با رویدادهای تنش‌زاست و افراد سرسخت، در برابر فشارها و تنش‌های روانی بسیار مقاوم هستند، آن‌ها را قابل کنترل می‌پنداشند، خود را متعهد می‌دانند و تلاش می‌کنند که بر آن‌ها فائق آیند و غالباً در این زمینه‌ها موفق هستند [۷]. سرسختی سلامت به عنوان یکی از ابعاد سرسختی به عنوان میزان تعهد فرد در انجام فعالیت‌های سلامت محور، توانمندی در کنترل سلامت و ادراک رویدادهای استرس‌زای سلامتی به عنوان فرستی برای رشد است [۸]. سرسختی سلامت شامل سه بخش کنترل، تعهد و مبارزه طلبی است که کنترل آن به میزان ادراک افراد از کنترل‌پذیری سلامت، تعهد آن به میزان تعهد افراد به انجام فعالیت‌های مرتبط با سلامت و مبارزه طلبی آن به ادراک افراد از اینکه چقدر عوامل استرس‌زای سلامتی فرستی برای رشد هستند، اشاره دارد [۹]. افراد دارای سرسختی سلامت زیاد غالباً سلامت و کیفیت زندگی بهتری دارند، هنگام مواجهه

رفتارهای ارتقادهنه سلامت، همبستگی مثبت و معنادار سرسختی مرتبط با سلامت و سبک زندگی ارتقادهنه سلامت، رابطه مثبت و معنادار سرسختی روان‌شناختی و پایبندی به سبک زندگی اسلامی، اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرسختی سلامت، همبستگی مثبت و معنادار بین رفتارهای تغذیه سلامت محور و شفقت به خود، همبستگی مثبت و معنادار رفتارهای سبک زندگی سلامت محور و شفقت به خود، همبستگی مثبت و معنادار سبک زندگی ارتقادهنه سلامت با شفقت به خود، رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی با شفقت به خود، اثربخشی رفتارهای سبک زندگی سلامت محور بر خود تنظیمی، ارتباط معنادار رفتارهای سلامت محور مرتبط با تنظیم هیجان، رابطه معنادار سبک زندگی اسلامی و تنظیم شناختی هیجان و آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بود [۳۶-۳۷].

با توجه به شیوع زیاد و در حال افزایش دیابت و از آنجاکه بیشتر مبتلایان به دیابت (حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد)، به دیابت نوع دو مبتلا هستند و این گروه مشکلات روان‌شناختی فراوانی دارند، لذا باید از روش‌های درمانی مؤثر برای بهبود ویژگی‌های آن‌ها استفاده کرد. با توجه به مبانی نظری بررسی شده، به نظر می‌رسد روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت نقش مؤثری در بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مبتلایان به دیابت نوع دو داشته باشد. پژوهش‌های بسیار اندکی درباره اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت انجام شده است و پژوهشی درباره اثربخشی آن بر سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان یافت نشد. همچنین، پژوهش‌های انجام‌شده درباره سبک زندگی و سه متغیر مذکور از نوع همبستگی بودند. درنتیجه، با توجه به نبود پیشینه پژوهشی درباره اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان، آمار زیاد و در حال افزایش دیابت نوع دو و مشکلات فراوانی که این گروه با آن مواجه هستند، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سبک

هیجان است که در رفتار آشکار فرد دیده می‌شود، در صورتی که تنظیم شناختی هیجان دیده نمی‌شود و ذهنی است [۱۹]. تنظیم رفتاری هیجان نشان‌دهنده راهبردها یا سبک‌های رفتاری برای کنترل و مدیریت هیجان است که فرد از آن‌ها برای پاسخ‌دهی به رویدادهای استرس‌زا و تنش آفرین استفاده می‌کند و شامل اقدام به انجام کارهای دیگر، کناره‌گیری، رویارویی فعال، جست‌وجویی حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن می‌شود [۲۰].

برای بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی گروه‌های آسیب‌پذیر (مانند مبتلایان به دیابت)، روش‌های مختلفی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت اشاره کرد که نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد و شامل آموزش تمام عوامل مرتبط با ارتقای سلامت مانند تغذیه، ورزش، خواب، کنترل استرس و قطع مصرف سیگار است [۲۱، ۲۲]. سبک زندگی یا رفتارهای ارتقادهنه سلامت شامل ۶ حوزه تغذیه، فعالیت فیزیکی، کنترل و مدیریت استرس، رشد معنوی، بهبود روابط میان‌فردي و مسئولیت‌پذیری در برابر سلامت است [۲۳].

تعديل سبک زندگی به عنوان سنگ بنای برنامه‌های مدیریت بهداشت زمینه را برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت فراهم می‌آورد [۲۴]. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت رویکردی چندبعدی از باورهای ادراک‌ها و رفتارهای ارادی فرد در زمینه‌های تقویت و تداوم سلامت و خودشکوفایی برای افزایش توانمندسازی فردی و اجتماعی در زمینه حفظ، تأمین و ارتقای سلامتی است [۲۵]. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت منع ارزشمندی برای ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس‌زای زندگی، بهبود کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز مثل نداشتن تحرک و استعمال دخانیات است [۲۱].

پژوهشی درباره اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان یافت نشد و بیشتر پژوهش‌ها در این زمینه از نوع همبستگی بودند؛ برای مثال، نتایج پژوهش‌ها حاکی از رابطه مثبت سرسختی با

بیشتر از دو جلسه و همکاری نکردن یا همکاری کم نمونه‌ها در جلسه‌های مداخله بودند.

مراحل انجام پژوهش بدین صورت بود که بعد از هماهنگی با مسئولان انجمن دیابت شهر اهواز و بیان اهمیت و ضرورت پژوهش، از آنان خواسته شد که مبتلایان به دیابت نوع دو را به پژوهشگر معرفی کنند. پژوهشگر پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه و بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و تعهد به رعایت نکات اخلاقی از جمله اصل رازداری، محترمانه ماندن اطلاعات شخصی، حفظ حریم نمونه‌ها، رعایت احترام متقابل، داشتن آزادی برای انصراف از ادامه همکاری در طول پژوهش، رضایت کامل برای شرکت در پژوهش و دریافت فرم رضایت‌نامه شرکت در پژوهش، آن‌ها را به عنوان نمونه انتخاب کرد و فرایند نمونه‌گیری تا زمان انتخاب ۵۰ نفر ادامه یافت. در مرحله بعد، نمونه‌ها به روش تصادفی با قرعه کشی در دو گروه مساوی ۲۵ نفری جایگزین شدند. یکی از گروه‌ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. گروه گواه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای تحت آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت قرار گرفت. گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش باقی ماند. در نمونه‌های گروه‌های آزمایش و گواه ریزشی اتفاق نیفتاد و تحلیل‌ها برای دو گروه ۲۵ نفری انجام شد.

آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت

یک متخصص روان‌شناسی سلامت دارای مدرک دوره آموزش سبک زندگی مداخله در گروه آزمایش را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کووید ۱۹ در یکی از کلینیک‌های خدمات روان‌شناختی شهر اهواز به صورت گروهی به مدت یک ماه (هفته‌ای دو جلسه) اجرا کرد. علیجانی و همکاران [۳۹] برنامه آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت را طراحی کردند که هدف و محتوای آن به تفکیک جلسات در جدول ۱ ارائه شده است.

زندگی ارتقادهنه سلامت بر سرسرختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو بود.

روش کار

این مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه پژوهش شامل مبتلایان به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت شهر اهواز در زمستان ۱۴۰۰ بودند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از معادله زیر و نتایج پژوهش احمدی و همکاران [۳۸] با مقادیر $\sigma=۰/۷۰$ ، $\alpha=۰/۰۵$ (انحراف معیار شفقت به خود بیماران دیابتی)، $d=۰/۵۰$ (اختلاف میانگین شفقت به خود بیماران دیابتی در مرحله پس‌آزمون)، $Power=۰/۹۰$ (توان آزمون) و $\alpha=۰/۰۵$ (آلfa)، حجم نمونه ۲۲/۹۰ برای هر گروه برآورد شد.

$$n_1 = n_2 = \frac{2\sigma^2(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + z_{1-\beta})^2}{d^2}$$

برای اطمینان از حجم نمونه و ریزش‌های احتمالی، حجم نمونه برای هر گروه ۲۵ نفر در نظر گرفته شد. بنابراین، ۵۰ نفر پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه، با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در روش نمونه‌گیری در دسترس، افرادی به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند که علاوه بر داشتن ملاک‌های ورود به مطالعه، در دسترس پژوهشگر باشند.

در این پژوهش، ملاک‌های ورود به مطالعه شامل ابتلا به دیابت نوع دو بر اساس پرونده موجود در انجمن دیابت شهر اهواز، داشتن حداقل تحصیلات دیپلم، تمایل به شرکت در پژوهش، سن ۲۱ تا ۴۰ سال، نداشتن سابقه دریافت آموزش مبتنی بر شفقت، نداشتن اعتیاد و مصرف داروهای روان‌پزشکی، استفاده نکردن از سایر روش‌های آموزشی یا درمانی به طور همزمان و نداشتن سابقه دریافت خدمات روان‌شناختی در سه ماه گذشته بود. ملاک‌های خروج از مطالعه نیز شامل انصراف از ادامه همکاری، غیبت

و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ در جمعیت دانشجویی ۰/۷۸ و در جمعیت عمومی ۰/۷۹، گزارش کردند [۸]. در ایران، دشت‌بزرگی و شمشیرگران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/۸۱، گزارش کردند [۴۰].

مقیاس شفقت به خود: Neff این مقیاس را با ۲۶ گویه طراحی کرد. برای پاسخگویی به هر گویه، پنج گزینه شامل تقریباً هر گز (نمره ۱)، بهندرت (نمره ۲)، گاهی (نمره ۳)، اغلب اوقات (نمره ۴) و تقریباً همیشه (نمره ۵) وجود دارد. نمره ابزار با مجموع نمره گویه‌ها محاسبه می‌شود. بنابراین، حداقل نمره در آن ۲۶ و حداکثر ۱۳۰ است. نمره بیشتر نشان‌دهنده شفقت به خود بیشتر است. Neff روایی سازه مقیاس را با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تأیید و پایایی آن را با روش‌های آلفای کرونباخ ۰/۹۰ و بازآزمایی دو هفته‌ای ۰/۹۱، گزارش کرد [۴۱]. در ایران، محمدعلی و همکاران روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن را با روش‌های آلفای کرونباخ

داده‌ها با فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی (جنسیت، سطح تحصیلات و سن)، سیاهه تجدیدنظرشده سرسختی سلامت (Revised Health Hardiness Inventory)، مقیاس شفقت به خود (Self-Compassion Scale) و پرسشنامه تنظیم رفتاری (Behavioral Emotion Regulation Questionnaire) هیجان (Behavioral Emotion Regulation Questionnaire) جمع‌آوری شد.

سیاهه تجدیدنظرشده سرسختی سلامت: Gebhardt و همکاران این سیاهه را با ۲۴ گویه طراحی کردند. برای پاسخگویی به هر گویه، پنج گزینه شامل کاملاً مخالفم (نمره ۱)، مخالفم (نمره ۲)، نظری ندارم (نمره ۳)، موافقم (نمره ۴) و کاملاً موافقم (نمره ۵) وجود دارد. برخی گویه‌ها به صورت معکوس نمره گذاری می‌شوند. نمره ابزار با مجموع نمره گویه‌ها محاسبه می‌شود. بنابراین، حداقل نمره در آن ۲۴ و حداکثر ۱۲۰ است. نمره بیشتر نشان‌دهنده سرسختی سلامت بیشتر است. Gebhardt و همکاران روایی ابزار را با ابزارهای منبع کنترل درونی و بیرونی سلامت تأیید

جدول ۱: هدف و محتوا آموزش سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت به‌تفکیک جلسات

جلسه	هدف	محتوا
اول	برقراری ارتباط و معرفی مختصر روش داخله	ایجاد ارتباط و معرفی افراد به یکدیگر، بیان اهداف جلسات و تکمیل تعهدنامه توسط بیماران، بررسی ابعاد سبک زندگی روزمره بیماران، تشریح ابعاد سبک زندگی سلامت محور جسمی و روانی و دریافت بازخورد
دوم	آموزش تغذیه و ارائه برنامه غذایی	بیان خلاصه جلسه قبل توسط بیماران، تشریح اصول تغذیه صحیح مرتبط با بیماری دیابت، ارائه برنامه تغذیه سالم و دریافت بازخورد
سوم	آموزش ورزش و ارائه برنامه ورزشی	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، بحث در زمینه ورزش و فواید جسمانی و روانی آن، آشنایی با روش‌های مناسب ورزش برای بیماران، ارائه یک برنامه مطلوب ورزشی، معرفی چند کتاب و دریافت بازخورد
چهارم	آموزش شناخت خواب و بهبود آن	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، بحث در زمینه خواب و برسی اختلال‌های خواب مرتبط با بیماری دیابت، بیان نکاتی درباره خواب مناسب و دریافت بازخورد
پنجم	آموزش مهارت‌های اجتماعی	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، تعریف مهارت‌های اجتماعی و تأثیر آن بر سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت، شناخت مهارت‌های اجتماعی، ارائه نکاتی برای بهبود ارتباط و دریافت بازخورد
ششم	آموزش مهارت‌های مقابله با استرس	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، آشنایی با عوامل استرس‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت، شناخت روش‌های مقابله با استرس و نحوه کاربست آن‌ها در زندگی و دریافت بازخورد
هفتم	آموزش نقش ارزش‌ها در سبک زندگی	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، تشریح ارزش‌ها و نقش آن در سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت، آموزش روش‌های مقابله معنوی (توکل، امید، شکیبایی، بخشش، شکرگاری و ...) و دریافت بازخورد
هشتم	مرور، جمع‌بندی و تمرین مهارت‌های جلسات قبل	بیان خلاصه جلسات قبل توسط اعضاء، تشریح نقش سبک زندگی جدید و چکونگی تداوم آن در زندگی توسط درمانگر، بررسی نظر بیماران درباره تجارب سبک زندگی جدید و چکونگی کاربست در زندگی واقعی

۰/۸۳، ۰/۸۶ و ۰/۹۱ به دست آمد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با ابزارهای فوق، با استفاده آزمون‌های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ در سطح معناداری ۰/۰۵ تحلیل شدند.

یافته‌ها

در این پژوهش، میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش $28/93 \pm 3/61$ سال و گروه گواه $3/84 \pm 12/28$ سال بود. نتایج مقایسه اطلاعات جمعیت‌شناختی گروه‌های آزمایش و گواه بر اساس آزمون خی دو در جدول ۲ ارائه شد.

طبق نتایج جدول ۲ و بر اساس آزمون خی دو، گروه‌های آزمایش و گواه از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سن تفاوت معناداری نداشتند ($P > 0/05$). نتایج میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان گروه‌های آزمایش و گواه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در جدول ۳ ارائه شد.

بررسی پیش‌فرض‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد فرض نرمال بودن متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت

۰/۷۷ و بازآزمایی ۰/۷۵ گزارش کردند [۴۲].

پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان: Kraaij و Garnefski این پرسشنامه را با ۲۰ گویه طراحی کردند. برای پاسخگویی به هر گویه، پنج گزینه شامل هرگز (نموده ۱)، گاهی (نموده ۲)، معمولاً (نموده ۳)، اغلب (نموده ۴) و همیشه (نموده ۵) وجود دارد. برخی گویه‌ها به صورت معکوس نمره گذاری می‌شوند. نمره ابزار با مجموع نمره گویه‌ها محاسبه می‌شود. بنابراین، حداقل نمره در آن ۲۰ و حداً کثر ۱۰۰ است. نمره بیشتر نشان‌دهنده تنظیم رفتاری هیجان مطلوب‌تر است. Kraaij و Garnefski روابی ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی ابعاد آن را با روش آلفای کرونباخ در دامنه ۰/۸۶ تا ۰/۹۳، ۰/۷۵ گزارش کردند [۱۸]. در ایران، مصلح و همکاران روابی و اگرای آن را با مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس تأیید و پایایی آن را با روش‌های آلفای کرونباخ ۰/۷۴ و بازآزمایی ۰/۸۲ گزارش کردند [۴۳].

در پژوهش حاضر، روابی مقیاس شفقت به خود و پرسشنامه تنظیم رفتاری سرسختی سلامت، مقیاس شفقت به خود و پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان با نظر ۱۵ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تأیید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب

جدول ۲: نتایج مقایسه اطلاعات جمعیت‌شناختی گروه‌های آزمایش و گواه بر اساس آزمون خی دو

متغیر	سطح	گروه آزمایش	تعداد	درصد	گروه گواه	تعداد	درصد	آماره	درجه آزادی	معناداري
زن	درصد	۱۵	۶	۱۶	۶۴	۱۶	۳۶	۰/۰۸۵	۱	۰/۷۷۱
مرد	درصد	۱۰	۴۰	۹	۳۶	۷	۲۸	۰/۹۶۱	۳	۰/۸۱۱
دبلیم	درصد	۹	۳۶	۴	۱۶	۵	۲۰	۰/۱۹۵	۳	۰/۹۷۸
کارداراني	درصد	۵	۲۰	۴	۱۶	۹	۳۶			
کارشناسي	درصد	۶	۲۴	۹	۳۶	۵	۲۰			
کارشناسي ارشد	درصد	۵	۲۰	۵	۲۰	۱۰	۴۰			
سن (سال)	درصد	۲۱	۳۶	۹	۳۶	۶	۲۴	۰/۹۶۱	۳	۰/۸۱۱
	درصد	۲۶	۲۴	۶	۲۴	۶	۲۴			
	درصد	۳۰	۲۴	۶	۲۴	۶	۲۴			
	درصد	۳۱	۲۴	۶	۲۴	۳	۱۲	۰/۰۸۵	۱	۰/۷۷۱
	درصد	۴۰	۱۶	۴	۱۶					

جدول ۳: نتایج میانگین و انحراف معیار سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان گروه‌های آزمایش و گواه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون

متغیر	پس‌آزمون	مرحله	آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت	میانگین	انحراف معیار	گواه
سرسختی سلامت	پیش‌آزمون		۴۳/۰۸۰	۷/۰۱۱	۴۲/۷۲۰	انحراف معیار
	پس‌آزمون		۵۱/۰۸۰	۷/۱۵۸	۴۲/۱۶۰	میانگین
	پیش‌آزمون		۵۴/۴۴۰	۶/۹۲۲	۵۴/۹۶۰	۶/۹۳۷
	پس‌آزمون		۶۴/۰۴۰	۶/۸۵۸	۵۴/۸۸۰	۷/۱۹۵
	پیش‌آزمون		۳۸/۰۴۰	۶/۵۰۹	۳۶/۴۸۰	۴/۲۱۴
	پس‌آزمون		۴۶/۹۶۰	۶/۱۲۶	۳۶/۱۲۰	۴/۴۲۸
	پس‌آزمون					

توجه به اندازه اثر ۹۷/۱ درصد تغییر متغیرها نتیجه روش مداخله یعنی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بود ($P < 0.001$). نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر هر ک از متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در جدول ۵ ارائه شد.

طبق نتایج جدول ۵ و بر اساس تحلیل کوواریانس چندمتغیری و مقدار میانگین‌ها، آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت باعث افزایش سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو شد که با توجه به اندازه اثر ۹۲/۷ درصد تغییر سرسختی سلامت، ۸۶/۳ درصد تغییر شفقت به خود و ۹۳/۴ درصد تغییر تنظیم رفتاری هیجان نتیجه روش مداخله یعنی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بود ($P < 0.001$).

به خود و تنظیم رفتاری هیجان گروه‌های آزمایش و گواه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف، فرض همگنی ماتریس‌های واریانس-کوواریانس بر اساس آزمون امباس و فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان بر اساس آزمون لون رد نشدند ($P > 0.05$). درنتیجه، استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری مجاز بود. نتایج آزمون‌های چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در جدول ۴ ارائه شد.

طبق نتایج جدول ۴ و بر اساس آزمون‌های چندمتغیری، بین گروه‌های آزمایش و گواه حداقل از نظر یکی از متغیرهای سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو تفاوت معناداری وجود داشت که با

جدول ۴: نتایج آزمون‌های چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه بر متغیرهای سلامت بر سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان

اثر	مقدار	F آماره	درجه آزادی فرضیه	درجه آزادی خطای معناداری	اندازه اثر
اثر پلایی	۰/۹۷۱	۴۷۷/۴۰۸	۳/۰۰۰	۴۳/۰۰۰	۰/۹۷۱
لامبدا ویلکز	۰/۰۲۹	۴۷۷/۴۰۸	۳/۰۰۰	۴۳/۰۰۰	۰/۹۷۱
اثر هاتلینگ	۳۳/۳۰۸	۴۷۷/۴۰۸	۳/۰۰۰	۴۳/۰۰۰	۰/۹۷۱
بزرگترین ریشه روی	۳۳/۳۰۸	۴۷۷/۴۰۸	۳/۰۰۰	۴۳/۰۰۰	۰/۹۷۱

جدول ۵: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه بـر هریک از متغیرهای سلامت بر سرـسختی سلامـت، شـفـقـتـ بـهـ خـودـ وـ تنـظـیـمـ رـفـتـارـیـ هـیـجانـ

متغیرها	منبع اثر	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F مقدار	معناداری	اندازه اثر
سرـسـختـیـ سـلامـتـ	پـیـشـآـزمـونـ	۲۱۰۶/۱۹۰	۱	۲۱۰۶/۱۹۰	۱۳۵۲/۸۴۵	۰/۰۰۱	۰/۹۶۸
	گـروـهـ	۸۹۶/۰۹۶	۱	۸۹۶/۰۹۶	۵۷۵/۵۷۹	۰/۰۰۱	۰/۹۲۷
	خطـاـ	۷۰/۰۵۹	۴۵	۱/۵۵۷			
	پـیـشـآـزمـونـ	۲۱۷۱/۵۰۸	۱	۲۱۷۱/۵۰۸	۵۴۴/۰۳۳	۰/۰۰۱	۰/۹۲۴
تنظـیـمـ رـفـتـارـیـ هـیـجانـ	گـروـهـ	۱۱۳۳/۱۱۴	۱	۱۱۳۳/۱۱۴	۲۸۳/۸۸۲	۰/۰۰۱	۰/۸۶۳
	خطـاـ	۱۷۹/۶۱۸	۴۵	۳/۹۹۲			
	پـیـشـآـزمـونـ	۱۲۸۷/۸۹۰	۱	۱۲۸۷/۸۹۰	۷۶۰/۸۹۶	۰/۰۰۱	۰/۹۴۴
	گـروـهـ	۱۰۷۳/۰۵۱	۱	۱۰۷۳/۰۵۱	۶۳۳/۹۶۷	۰/۰۰۱	۰/۹۳۴
	خطـاـ	۷۶/۱۶۷	۴۵	۱/۶۹۳			

گفت که آشنایی با سبک زندگی ارتقادهنه سلامت و رفتارهای مرتبط با آن فرد را بـر آن مـی دارد کـهـ زـمـینـهـهـاـیـ اـیـجادـ یـاـ تـقوـیـتـ رـفـتـارـهـاـ وـ عـادـتـهـاـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ رـاـ درـ خـودـ اـیـجادـ کـنـدـ [۲۹]. آـمـوزـشـهـاـیـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ باـعـثـ حـفـظـ مـسـؤـلـیـتـ پـذـیرـیـ درـ قـبـالـ سـلامـتـ جـسـمـانـیـ،ـ هـیـجانـیـ،ـ اـجـتـمـاعـیـ وـ رـوـانـشـناـختـیـ مـیـ شـوـدـ کـهـ نقـشـ مـهـمـیـ درـ بـرـآـورـدـ رـضـایـتـ اـزـ زـندـگـیـ وـ کـیـفـیـتـ زـندـگـیـ اـفـرادـ دـارـنـدـ. عـلـاـوـهـ بـرـ اـيـنـ،ـ وـقـتـ اـفـرادـ درـ طـولـ مـداـخـلـهـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ اـزـ تـأـثـیرـ مـثـبـتـ رـفـتـارـهـاـ مـداـخـلـهـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ اـزـ تـأـثـیرـ مـثـبـتـ رـفـتـارـهـاـ سـالـمـ آـكـاهـیـ يـاـنـدـ وـ بـهـ طـورـ عـلـمـیـ آـنـهـاـ رـاـ تـمـرـیـنـ کـنـنـدـ وـ بـهـ نقـشـ آـنـهـاـ درـ اـيـجادـ طـراـوتـ وـ شـادـابـیـ پـیـ بـرـنـدـ،ـ اـيـنـ مـوـضـوعـ زـمـينـهـ رـاـ بـرـایـ اـنـجـامـ هـرـچـهـ بـهـترـ رـفـتـارـهـاـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ فـراـهمـ مـیـ آـورـدـ. نـکـتهـ مـهـمـ دـیـگـرـ اـيـنـ استـ کـهـ روـشـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ يـكـیـ اـزـ روـشـهـاـ مـؤـثـرـ بـرـایـ حـفـظـ،ـ کـنـترـلـ وـ بـهـبـودـ سـلامـتـ استـ وـ تـعـدـیـلـ سـبـکـ زـندـگـیـ،ـ يـكـیـ اـزـ پـایـهـهـاـ اـصـلـیـ بـرـنـامـهـهـاـ مـدـیرـیـتـ بـهـداـشتـ استـ کـهـ زـمـينـهـ رـاـ بـرـایـ اـرـتقـایـ سـلامـتـ جـسـمـیـ،ـ رـوـانـیـ وـ کـیـفـیـتـ زـندـگـیـ درـ طـولـ زـندـگـیـ فـراـهمـ مـیـ کـنـدـ. روـشـ مـذـکـورـ باـ درـ گـیرـ سـاخـتنـ اـفـرادـ مـبـلـاـ بـهـ بـیـمـارـیـهـاـ مـخـتـلـفـ (ـازـ جـملـهـ مـبـلـاـیـانـ بـهـ دـیـبـاـتـ نوعـ دـوـ)ـ درـ رـفـتـارـهـاـ خـودـمـراـقـبـتـیـ،ـ جـلـبـ حـمـایـتـ مـبـلـاـیـانـ بـهـ دـیـبـاـتـ نوعـ دـوـ)ـ درـ رـفـتـارـهـاـ خـودـمـراـقـبـتـیـ،ـ جـلـبـ حـمـایـتـ

بحث و نتیجه گیری

شـیـوـعـ زـیـادـ وـ درـ حـالـ اـفـزـایـشـ دـیـبـاـتـ وـ مشـکـلـاتـ رـوـانـشـناـختـیـ فـراـوـانـیـ کـهـ مـبـلـاـیـانـ بـهـ دـیـبـاـتـ بـاـ آـنـ مـواـجـهـ هـسـتـنـدـ،ـ پـژـوهـشـگـرانـ رـاـ بـرـ آـنـ دـاشـتـ کـهـ اـثـربـخـشـیـ آـمـوزـشـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ رـاـ بـرـ سـرـسـختـیـ سـلامـتـ،ـ شـفـقـتـ بـهـ خـودـ وـ تـنـظـیـمـ رـفـتـارـیـ هـیـجانـ درـ مـبـلـاـیـانـ بـهـ دـیـبـاـتـ نوعـ دـوـ بـرـرسـیـ کـنـدـ.

نتـایـجـ اـيـنـ مـطـالـعـهـ نـشـانـ دـادـ آـمـوزـشـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ باـعـثـ اـفـزـایـشـ سـرـسـختـیـ سـلامـتـ درـ مـبـلـاـیـانـ بـهـ دـیـبـاـتـ نوعـ دـوـ شـدـ کـهـ اـيـنـ نـتـیـجـهـ اـزـ جـهـاتـیـ باـ نـتـایـجـ پـژـوهـشـهـاـیـ Cressـ وـ Lampmanـ مـبـنـیـ بـرـ رـابـطـهـ مـثـبـتـ رـفـتـارـهـاـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ باـ سـرـسـختـیـ [۲۶]ـ وـ Hـumـk~ar~anـ مـبـنـیـ بـرـ هـمـبـستـگـیـ مـثـبـتـ وـ مـعـنـادـارـ بـینـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ وـ سـرـسـختـیـ مـرـبـطـ باـ سـلامـتـ،ـ الـهـیـ وـ هـمـکـارـانـ مـبـنـیـ بـرـ رـابـطـهـ مـثـبـتـ وـ مـعـنـادـارـ پـایـنـدـیـ بـهـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـسـلـامـیـ وـ سـرـسـختـیـ رـوـانـشـناـختـیـ وـ پـرـمـهـرـ وـ دـشـتـبـزـرـگـیـ مـبـنـیـ بـرـ اـثـربـخـشـیـ آـمـوزـشـ سـبـکـ زـندـگـیـ اـرـتـقادـهـنـدـهـ سـلامـتـ بـرـ اـفـزـایـشـ سـرـسـختـیـ سـلامـتـ هـمـسـوـ بـودـ [۲۷،۲۸،۲۹]ـ. درـ تـبـیـینـ اـيـنـ نـتـایـجـ بـرـ مـبـنـیـ پـژـوهـشـ پـرـمـهـرـ وـ دـشـتـبـزـرـگـیـ مـیـ تـوانـ

Zندگی سلامت محور بر افزایش خودتنظیمی، Gomez-Acosta و Londono مبنی بر ارتباط معنادار بین رفتارهای سلامت محور و تنظیم هیجان، رسمی نسب دولت آباد و همکاران مبنی بر رابطه معنادار سبک زندگی اسلامی و تنظیم شناختی هیجان و میرزاچی و حسنی مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان همسو بود [۳۷-۳۴]. در تبیین این نتایج بر مبنای پژوهش رضایی و همکاران می‌توان گفت که در کنار آموزش‌های جسمانی آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت مانند تغذیه، ورزش و رژیم غذایی، آموزش‌های روانی و روش آموزشی مذکور مانند مدیریت استرس، روابط اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در مقابل سلامتی نقش مهمی در بهبود تنظیم هیجان از طریق افزایش سازگاری دارند [۴۴]. در واقع، انجام آموزش‌های جسمانی و روانی در مداخله سبک زندگی ارتقادهنه سلامت نقش مهمی در فرآگیری روش‌های مقابله با فشارهای روانی و مشکلات زندگی دارد. این آموزش‌ها مبتلایان به دیابت را توانمند می‌سازد تا بتوانند با مشکلات و فشارهای روانی زندگی مقابله کنند یا با آن‌ها کنار بیابند. بنابراین، آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت میزان دانش و آگاهی مبتلایان به دیابت را افزایش می‌دهد، باعث تغییر نگرش‌ها، عادت‌ها و رفتارهای نادرست آن‌ها می‌شود و زمینه ایجاد و افزایش نگرش‌ها، عادت‌ها و رفتارهای درست و مناسب را در آن‌ها فراهم می‌سازد. بنابراین، روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت باعث افزایش تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع می‌شود.

مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش شامل پیگیری نکردن نتایج در بلندمدت، استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس، دشواری انتخاب نمونه‌ها برای شرکت در پژوهش به دلیل شیوع کووید ۱۹ و استفاده از ابزارهای خودگزارش‌دهی برای گردآوری داده‌ها بودند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود پایداری نتایج در بلندمدت از طریق دوره‌های پیگیری بررسی شود، از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی به دلیل خطای نمونه‌گیری کمتر و از مصاچه

اجتماعی و بهبود علائم روان‌شناختی، سبب ارتقای وضعیت‌های مرتبط با سلامتی می‌شود. بنابراین، روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت با توجه به فرایندهای توضیح داده شده می‌تواند سبب افزایش سرخستی سلامت در مبتلایان به دیابت نوع شود. نتایج این مطالعه نشان داد آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت باعث افزایش شفقت به خود در مبتلایان به دیابت نوع دو شد که این نتیجه از جهاتی با نتایج پژوهش‌های Fan و Wang مبنی بر همبستگی مثبت و معنادار بین رفتارهای تغذیه سلامت محور و شفقت به خود، Koch و همکاران مبنی بر همبستگی مثبت و معنادار رفتارهای سبک زندگی سلامت محور و شفقت به خود، Gedik مبنی بر همبستگی مثبت و معنادار رفتارهای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت با شفقت به خود و بزدانی و مؤمنی مبنی بر رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی با شفقت به خود همسو بود [۳۰-۳۳]. در تبیین این نتایج بر مبنای پژوهش Koch و همکاران می‌توان گفت که آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد و در برگیرنده تمام عوامل مرتبط با زندگی سلامت محور شامل تغذیه، ورزش، خواب، مدیریت استرس و قطع مصرف سیگار و دخانیات می‌شود [۳۱]. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت رویکردی چندبعدی از ادراکات و اعمال ارادی فرد است که به تداوم و تقویت سطح سلامت و خودشکوفایی می‌انجامد و باعث بهبود سطح سلامتی، رفاه، پذیرش مسائل، افزایش احساس رضایت، اقناع شخصی و خودشکوفایی می‌شود. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت از طریق فرایندهای فوق و بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی، نقش مؤثری در افزایش شفقت به خود در مبتلایان به دیابت نوع دو داشته باشد.

نتایج دیگر این مطالعه نشان داد آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت باعث افزایش تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو شد که این نتیجه از جهاتی با نتایج پژوهش‌های Lopez-Gil و همکاران مبنی بر اثربخشی پایندی بیشتر به رفتارهای سبک

بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی (بهویژه افزایش سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان) گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مبتلایان به دیابت نوع دو، از روش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت در کنار سایر روش‌های مؤثر استفاده کنند.

قدردانی

این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گرفته شده است این پژوهش با از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز کد اخلاق IR.IAU.AHVAZ.REC.1401.082 دارد. بدین‌وسیله نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند از مسئولان انجمان دیابت شهر اهواز به دلیل همکاری در انجام این مطالعه و از مبتلایان به دیابت نوع دو به دلیل مشارکت در مطالعه تشکر کنند.

تعارض در منافع

بین نویسنده‌گان مقاله حاضر هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

برای گردآوری داده‌ها استفاده شود. همچنین، بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت روی ویژگی‌های روان‌شناختی سایر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مبتلایان به سلطان، مبتلایان به وسوس و ... پیشنهاد می‌شود. آخرین پیشنهاد پژوهشی این است که اثربخشی روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت با سایر روش‌های آموزشی از جمله آموزش پذیرش و تعهد، آموزش مبتنی بر شفقت، آموزش ذهن‌آگاهی و ... مقایسه شود.

به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر افزایش سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو مؤثر بوده است. این نتایج برای متخصصان، مسئولان و برنامه‌ریزان انجمان دیابت و درمان‌گران، مشاوران و روان‌شناسانی که با گروه‌های آسیب‌پذیر سروکار دارند، از جمله مبتلایان به دیابت تلویحات کاربردی دارد. بر اساس یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌های مشابه، متخصصان، مسئولان و برنامه‌ریزان انجمان دیابت می‌توانند در سیاست‌گذاری‌های آموزشی خود برنامه‌هایی را به‌منظور استفاده از روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت برای بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی و مرتبط با سلامت مبتلایان به دیابت طراحی و اجرا کنند. همچنین، درمان‌گران، مشاوران و روان‌شناسان می‌توانند در مداخله‌های روان‌شناختی خود به‌منظور

References

- Mannucci E, Targher G, Nreu B, Pintaudi B, Candido R, Giaccari A, et al. Effects of insulin on cardiovascular events and all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2022; 32(6): 1353-60.
- Mattsson K, Nilsson-Condori E, Elmerstig E, Vassard D, Schmidt L, Ziebe S, et al. Fertility outcomes in women with pre-existing type 2 diabetes-a prospective cohort study. Fertil Steril 2021; 116(2): 505-13.
- Klaprat N, Benjamin C, Brandt J, Gregoire N, Merrill K, Mackay D, et al. Restructuring clinical trials in type 1 diabetes and exercise in the context of adult patient-oriented research: An intervention codevelopment protocol. Can J Diabetes 2020; 44(8): 734-9.
- Jani Darmian H, Khazaie T, Yaghoubi G, Sharifzadeh G, Akbari A. Effect of multimedia education on eye care performance and perception of the disease in type 2 diabetic patients referred to Birjand diabetic clinic. J Health Res Commun 2020; 5(4): 57-67 (Persian).
- Legaard GE, Feineis CS, Johansen MY, Hansen KB, Vaag AA, Larsen EL, et al. Effects of an exercise-

- based lifestyle intervention on systemic markers of oxidative stress and advanced glycation endproducts in persons with type 2 diabetes: Secondary analysis of a randomised clinical trial. *Free Radic Biol Med* 2022; 188: 328-36.
6. Ezazi Bojnourdi E, Ghadampour S, Moradi Shakib A, Ghazbanzadeh R. Predicting corona anxiety based on cognitive emotion regulation strategies, health hardiness and death anxiety in diabetic patients. *IJPN* 2020; 8(2): 34-44 (Persian).
 7. Tu YF, Lai CL, Hwang GJ, Chen CK. The role of hardiness in securities practitioners' web-based continuing learning: Internet self-efficacy as a mediator. *Educ Technol Res Dev* 2021; 69(5): 2547-69.
 8. Gebhardt WA, Vander Doef M, Paul LB. The revised health hardiness inventory (RHII-24): Psychometric properties and relationship with self-reported health and health behavior in two Dutch samples. *Health Educ Res* 2001; 16(5): 579-92.
 9. Jie L, Xueli L, Caixia T, Yanping W. The current status and influencing factors of health-related hardiness among maintenance hemodialysis patients. *Chin J Integr* 2019; 5(9): 10-14.
 10. Dymcka J, Bidzan-Bluma I, Bidzan M, Borucka-Kotwica A, Atroszko P, Bidzan M. Validity and reliability of the Polish adaptation of the Health-Related Hardiness Scale – the first confirmatory factor analysis results for a commonly used scale. *Health Psychol Rep* 2020; 8(3): 248-62.
 11. Morgan TL, Semenchuk BN, Ceccarelli L, Kullman SM, Neilson CJ, Scott D, et al. Self-compassion, adaptive reactions and health behaviours among adults with prediabetes and type 1, type 2 and gestational diabetes: A scoping review. *Can J Diabetes* 2020; 44(6): 555-65.
 12. Fresnics AA, Wang SB, Borders A. The unique associations between self-compassion and eating disorder psychopathology and the mediating role of rumination. *Psychiatry Res* 2019; 274: 91-7.
 13. Jones KM, Brown L, Houston EE, Bryant C. The role of self-compassion in the relationship between hot flushes and night sweats and anxiety. *Maturitas* 2021; 144: 81-6.
 14. Yang Y, Fletcher K, Michalak EE, Murray G. An investigation of self-compassion and nonattachment to self in people with bipolar disorder. *J Affect Disord* 2020; 262: 43-8.
 15. Turk F, Kellett S, Waller G. Determining the potential links of self-compassion with eating pathology and body image among women and men: A cross-sectional mediational study. *Body Image* 2021; 37: 28-37.
 16. Coccaro EF, Lazarus S, Joseph J, Wyne K, Drossos T, Phillipson L, et al. Emotional regulation and diabetes distress in adults with type 1 and type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2021; 44(1): 20-5.
 17. Cavicchioli M, Scalabrin A, Northoff G, Mucci C, Ogliari A, Maffei C. Dissociation and emotion regulation strategies: A meta-analytic review. *J Psychiatr Res* 2021; 143: 370-87.
 18. Kraaij V, Garnefski N. The behavioral emotion regulation questionnaire: Development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the cognitive emotion regulation questionnaire. *Pers Individ Differ* 2019; 137: 56-61.
 19. Te Brinke LW, Schuiringa HD, Menting AT, Dekovic M, De Castro BO. A cognitive versus behavioral approach to emotion regulation training for externalizing behavior problems in adolescence: Study protocol of a randomized controlled trial. *BMC Psychol* 2018; 6(49): 1-12.
 20. Perry NB, Dollar JM. Measurement of behavioral emotion regulation strategies in early childhood: The early emotion regulation behavior questionnaire (EERBQ). *Children* 2021; 8(779): 1-17.
 21. Rathnayake N, Alwis G, Lenora J, Mampitiya I, Lekamwasam S. Effect of health-promoting lifestyle modification education on knowledge, attitude, and quality of life of postmenopausal women. *Biomed Res Int* 2020; 2020: 1-11.
 22. Beumeler LF, Waarsenburg EC, Booij SH, Scheurink AJ, Hoenders HJ. Evaluation of a lifestyle intervention program in primary care on physical and mental health and quality of life of cancer survivors: A pilot study. *EuJIM* 2018; 23: 1-5.
 23. Joseph-Shehu EM, Ncama BP. Evidence on health-promoting lifestyle practices and information and communication technologies: Scoping review protocol. *BMJ Open* 2017; 7(3): e014358.
 24. Lu J, Zhang C, Xue Y, Mao D, Zheng X, Wu S, et al. Moderating effect of social support on depression and health promoting lifestyle for Chinese empty nesters: A cross-sectional study. *J Affect Disord* 2019; 256: 495-508.
 25. Almutairi KM, Alonazi WB, Vinluan JM, Almigbal TH, Batais MA, Alodhayani AA, et al. Health promoting lifestyle of university students in Saudi Arabia: a cross-sectional assessment. *BMC Public Health* 2018; 18(1093): 1-10.
 26. Cress VC, Lampman C. Hardiness, stress, and health-promoting behaviors among college students. *J*

- Undergrad Res 2007; 12(1): 18-23.
27. Lee JI, Kim SY, Seo KS. Effects of self-efficacy, health related hardness on a health promoting lifestyle of middle-aged people. J Korean Acad Soc Nurs Educ 2007; 13(2): 177-83.
28. Elahi M, Molaei F, Jalali Rigi M, Fouladi M, Momenijoo N. The role of adherence to Islamic lifestyle and psychological hardness in the rate of marital conflicts. ILS 2022; 6(2): 11-9 (Persian).
29. Pormehr S, DashtBozorgi Z. Comparison the effectiveness of mindfulness based on acceptance and commitment with health promoting lifestyle on mental well-being and health hardness diabetic elderly. J Gerontol 2022; 7(1): 40-52 (Persian).
30. Fan L, Wang Y. Healthy eating behaviors and self-control in scarcity: The protective effects of self-compassion. Appetite 2022; 169: 105860.
31. Koch JM, Ross JB, Karaffa KM, Rosencrans ACR. Self-compassion, healthy lifestyle behaviors, and psychological well-being in women. JPHP 2021; 2(2): 220-4.
32. Gedik Z. Self-compassion and health-promoting lifestyle behaviors in college students. Psychol Health Med 2019; 24(1): 108-14.
33. Yazdani MR, Momeni K. The role of life style and toleration in predicting mental health and self-compassion among the students of Razi University in Kermanshah, 2014. J of Clin Res Paramed Sci 2016; 5(2): 115-24 (Persian).
34. Lopez-Gil JF, Oriol-Granado X, Izquierdo M, Ramirez-Velez R, Fernandez-Vergara O, Olloquequi J, et al. Healthy lifestyle behaviors and their association with self-regulation in Chilean children. IJERPH 2020; 17(5676): 1-10.
35. Gomez-Acosta A, Londono Perez C. Emotion regulation and healthy behaviors of the body energy balance in adults: A review of evidence. Acta Colomb de Psicol 2020; 23(1): 349-65.
36. RostamiNasab DolatAbad Z, Ehsanpour F, Mohammadkhani M, Shariatmadar Tehrani A, Bagheri Mahyari N. The moderating role of Islamic lifestyle in the relationship between cognitive emotion regulation and mobile dependency in Kermanshah's adolescent girls in 2017. SBMU 2019; 5(3): 84-95 (Persian).
37. Mirzei S, Hasani J. The effectiveness of life skills training in cognitive emotion regulation strategies of adolescents. NKUMS 2015; 7(2): 405-17 (Persian).
38. Ahmadi Z, Bazzazian S, Tajeri B, Rajab A. Comparing the effectiveness of laughter therapy and solution-based therapy on hopefulness, meaningfulness, self-compassion, and hyperglycemia reduction among elderly patients with type II diabetes. CHJ 2021; 8(2): 205-20 (Persian).
39. Alijani S, Akrami N, Faghih-Imani E. The effectiveness of lifestyle modification training on psychological symptoms and glycemic control in patients with type II diabetes. Behav Sci 2015; 13(4): 562-71 (Persian).
40. DashtBozorgi Z, Shamshirgaran M. Effectiveness of positive training on social competence and health hardness in nurses. Posit Psychol 2018; 4(2): 13-24 (Persian).
41. Neff KD. The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness 2016; 7(1): 264-74.
42. Mohammadali S, Manavipour D, Sedaghatifard M. Investigating the psychometric characteristics (validity and reliability) of the self-compassion scale: Finding empirical evidence for using the total score and defining the concept of self-compassion. Appl Psychol 2020; 14(2): 29-50 (Persian).
43. Mosleh SGh, Badri Gargari R, Nemati S. Psychometric properties of Behavioral Emotion Regulation Questionnaire in sample of adolescent students in Urmia city. J Clin Psychol 2020; 18(1): 163-75 (Persian).
44. Rezaee Z, Esmaeili M, Tabaeian SR. The influence of group training of health promoting life style on the vitality, pleasure and social adjustment of women with type II diabetic in Isfahan city. JJHS 2016; 15(5): 581-90 (Persian).